



# Přišli k nám z pravěku?

Africký postrach kongamoto údajně vypadá jako obří netopýr a troufne si i na člověka. Podle vědců měl ale vymřít před desítkami milionů let

Mgr. Vladimír Socha  
autor je paleontolog

Existuje skutečně yetti? A co lochneska nebo mokele mbembe? Mohou se v neprostupných středoafričských lesích ukrývat velcí plazi podobní dinosaurům? Tím vším se zabývá kryptozoologie – vědní obor, o kterém většina biologů nechce ani slyšet



Zakladatel kryptozoologie  
Bernard Heuvelmans  
(1916–2001)

Otcem kryptozoologie je francouzsko-belgický vědec, průzkumník a spisovatel **Bernard Heuvelmans** (1916–2001). Již roku 1948 publikoval jeho skotský kolega **Ivan T. Sanderson** (1911–1973) článek *Mohli by tu být dinosaurů*, kde jako první přichází s vážně míněným tvrzením, že v odlehlých koutech planety mohou dosud přežívat dinosaurů. Heuvelmans poté jeho myšlenky rozvedl a stal se prakticky zakladatelem nového odvětví biologie – kryptozoologie. Jeho nejvlivnějším dílem byla kniha *Na stopě neznámých zvířat*, která vyšla ve francouzštině roku 1955. „**Mořští hadi**“, „**ledoví muži**“ a další **kryptidi** (dosud neodhalené tvorové) vděčí za svou popularitu právě Heuvelman-

sovi. Díky němu se kryptozoologie dostala do povědomí širší veřejnosti.

Heuvelmans požadoval, aby nový vědní obor pracoval přísně vědeckými metodami, na druhou stranu však zohledňoval i laická svědectví o existenci neznámých organismů. Právě závislost na nejistých svědectvích je důvodem, pro který je kryptozoologie u klasických přírodovědců v nemilosti. **V současnosti je považována za pseudovědu, nebo dokonce karikaturu skutečné vědecké disciplíny.** I přes četné úspěchy v objevování nových živočišných druhů (například asijský kopytník saola v roce 1992) si tak kryptozoologie na svoji rehabilitaci bude muset ještě počkat. Zatím je alespoň fascinujícím doplňkem akceptovaných biologických oborů a zdrojem nikdy nevysychajícího úžasu nad


tajemstvími přírody. Stojí za zmínku, že mezi českými autory se problematice kryptozoologie dlouhodobě věnuje například Jaroslav Mareš.

### Dinosauři v 20. století

Mezi nejzajímavější příklady kryptidů patří nepochybně tvorové domněle reprezentující přežívající pravěká zvířata. Na prvním místě se samozřejmě jedná o dinosaury, kteří vyhynuli asi před 65,5 miliony let (s výjimkou ptáků). Již od 18. století přicházejí z tropických oblastí Afriky a Jižní Ameriky svědectví o podivných tvorech, podobných „předpotopním příšerám“. **Například mokele mbembe z rovníkové Afriky má být živočich podobný sauropodním dinosaurům – s malou hlavou na velmi dlouhém štíhlém krku.** Většina zoologů je však přesvědčena, že svědčí ve skutečnosti viděli slony, brodící se jezerem se zdviženým chobotem. Legendárního tvora mokele

## Přízrak z hlubin

Na základě vyprávění námořníků z dávných i novějších dob vznikla legenda o existenci neuvěřitelně velkých a inteligentních chobotnic, schopných převrátit velkou loď. Prý jsou veliké až 60 metrů. A skutečnost? Největší oficiálně změřená chobotnice druhu *Enteroctopus dofleini* měla na délku „pouhých“ 6,1 metrů.



### Létající monstra

Také létající příbuzní dinosaurů – ptakoještěři – se údajně vznášejí nad planetou Zemí dodnes, ačkoli podle učebnic vyhynuli na konci druhohor již před desítkami milionů let. Lidé je prý pozorovali jak v odlehlých koutech Země (jako jsou pralesy rovníkové Afriky nebo planiny pouště Namib), tak v obydlených místech Spojených států amerických a Evropy. Kuriózní svědectví pochází z americké Alabamy, kde podnapilý řidič

obří varany v Indonésii, šavlozubé tygry v Indii nebo třeba velké vačnatce diprotodonty v Austrálii.

### Obří z hlubin

Dalšími známými kryptidy jsou mořští netvoři, mající obvykle podobu obřích hlavonožců (chobotnic a olihní), gigantických žraloků a mořských hadů. Do posledně jmenované skupiny patří velcí tvorové podlouhlého tvaru těla, jejichž pozorování se datuje již do starověku.

**Kryptozoolog Bruce Champagne zaznamenal přes 1 200 svědectví těchto legendárních mořských příšer,** většinou však šlo o špatně pochopené setkání s kytovci nebo zvláštními rybami hlístouny (čeleď Regalecidae), které mohou dosahovat délky až 17 metrů. Přesto se objevují názory, že ve skutečnosti by mořští hadi mohli být přežívající druhohorní plazi – ještěrovití mosasauři, delfinovití ryboještěři (ichtyosauři) nebo dlouhokrčí plesiosauři. Mezi posledně jmenované je často řazena také proslulá lochnesská příšera. I v tomto případě však opět platí dříve řečené – stejně jako dinosaury nemohli velcí druhohorní obyvatelé moří přežít nepozorovaně až do současnosti. **K přežití by totiž potřebovali stálou,**

## ” Přežili snad zástupci dinosaurů, kteří měli vyhynout už před miliony let?

mbembe údajně několikrát spatřili účastníci průzkumných expedic, přesvědčivý důkaz o jeho existenci ale nepřinesli.

Za další možné dosud žijící dinosaury bývá označován jiný africký tvor zvaný emelantuka, fantasy přirovnávaný k přežívajícím rohatým dinosaurům (ceratopsidům), nebo jihoamerický netvor Stoa, kterého kryptozoologové považují za velkého dravého (teropodního) dinosaura. Očitá svědectví tyto tvory podobné plazům popisují jako velké a nesmírně silné. **Pravděpodobnost přežití neptačích dinosaurů až do současnosti je ovšem mizivě malá** a existence této skupiny domnělých kryptidů je tak velmi pochybná.

vysvětloval svoji dopravní nehodu šokem z pozorování ptakoještěra kroužícího nad jeho autem.

**Celebritou mezi pterosauřími kryptidy je však africký postrach kongamato.** Podle konžských domorodců jde o tvora s kožnatými, dvoumetrovými netopýřími křídly, který se nerozpakuje napadnout i člověka. Stejně jako v případě mokele mbembe však ani kongamato nebyl přes četná prohlášení o jeho pozorování nikdy kvalitně vyfotografován nebo nafilmován.

Mluvíme-li o údajně přežívajících pravěkých tvorech, musíme alespoň zmínit také domnělé mamuty na Sibiři,



Dinosaur s malou hlavou na dlouhém štíhlém krku děsí domorodce rovníkové Afriky. Podle zoologů však nejspíš viděli plujícího slona se zdviženým chobotem

# víte, že?

## ZÁHADA Z PODZEMÍ

Také v roce 2012 byl už údajně spatřen nový živočich. Tentokrát se jedná o prapodivného křížence psa a divokého prasete, který obchází Severní Namibii a děsí místní obyvatele. Podle nich jde o zplodence černé magie, podle kryptozoologů snad o ojedinělý exemplář hrabáče, tedy zemního prasete **100+1**

**poměrně početnou populaci, která by modernímu výzkumu moří sotva zůstala utajena.**

Také k vysvětlení pozorování obřího žraloka sahají kryptozoologové do pravěku – tentokrát je jejich favoritem obří příbuzný žraloka lidožravého *Carcharodon megalodon*. Tento třetihorní obr mohl dosahovat délky až 18 metrů a vážit přes 50 tun, jen jeho čelisti přitom měly rozpětí 1,8 metru! Nálezy obřích zubů tohoto žraloka, vypadajících jako poměrně mladé a ještě ne zcela zkamenělé (subfosilní), by však skutečně mohly nasvědčovat existenci těchto obřích paryb ještě po skončení poslední doby ledové.

Obří hlavonožci skutečně existují. **Krakatice obrovská (*Architeuthis dux*) je jedním z největších bezobratlých živočichů: i s nataženými chapadly může měřit na délku přes 13 metrů.** Ještě o metr delší je kalmar Hamiltonův (*Mesonychoteuthis hamiltoni*), který je s hmotností až 495 kg zřejmě největším známým měkkýšem. Kryptozoologové však uvádějí nesrovnatelně větší rozměry možných současných zástupců – průběžně se objevují zprávy o gigantických jedincích, dosahujících délky přes 20 metrů.

### Yeti a lekaví trpasličí

Pomineme-li zmíněnou skotskou loch-nesku, patří titul **nejpopulárnějších**

## Gévaudanská bestie

Nejagresivnějším zvířetem, jehož záhada nebyla dosud odhalena, je takzvaná Gévaudanská bestie, která řádila v letech 1764 až 1767 na jihu Francie. Zvíře zde údajně připravilo o život na dvě stě lidí. Podle nadšenců z řad kryptozoologie šlo možná o poslední pozůstatek dravých Mesonychidů, tedy vyhynulých příbuzných dnešních sudokopytníků. Dobová svědectví nicméně hovoří spíše o vzteklém kříženci vlka a psa.



**Okapi, příbuzná žirafy, se stala symbolem kryptozoologie a důkazem, že ještě ve 20. století je možné objevit tak velkého neznámého tvora**

**kryptidů velkým primátům, jako jsou himálajský yeti, severoamerický bigfoot (či seskvec) nebo indonéský orang pendek.** Je téměř jisté, že pozorování těchto chlupatých, člověku podobných bytostí můžeme připsat

Indie a Vietnamu. Dosahoval hmotnosti přes půl tuny a obýval nejspíše bambusové porosty. Je však velmi nepravděpodobné, že by se mohl dožít současnosti, přinejmenším v dostatečně početné populaci.

## ” Yeti by mohl být potomkem dávného obřího primáta gigantopitéka

na vrub jiným zvířatům nebo zrakovým klamům. Nechybí ovšem ani zajímavější vysvětlení, i když velmi nepravděpodobné: Yeti by mohl být přežívajícím potomkem největšího primáta v dějinách planety, obřího gigantopitéka (*Gigantopithecus blacki*). Tento asi tři metry vysoký obr žil v období pleistocénu na území dnešní Číny,

**Orang pendek je údajně malým, dvounohým primátem o výšce kolem 90 cm, vyskytujícím se v pralesích ostrova Sumatra.** Již po staletí vyprávějí místní domorodci i nizozemští námořníci o těchto malých bytostech, velmi lekavých a stranících se lidí. V minulém desetiletí objevili britští vědci také domnělé stopy tohoto záhadného stvoření, které údajně nepatří žádnému dosud známému primátovi. Největším překvapením v příběhu o orang pendekovi byl však paleontologický objev zkamenělin trpasličího člověka druhu *Homo floresiensis* v roce 2003. **Na ostrově Flores žil ještě v době asi před 13 tisíci lety a byl tak posledním zástupcem hominidů s výjimkou moderního člověka.** Je snad možné, že jeho stejně malí potomci přežili dodnes? I na tuto hádanku se snaží odpovědět kryptozoologie, opovrhovaná věda opředená lákavým tajemstvím. **100+1**